



Si ejerces la prostitución y/o
estás en situación de
exclusión social podemos
ayudarte

CONTACTO

944.16.48.28 / 621.18.44.52

Calle Amparo, lonja 1, 48003, Bilbao

agentes@askabide.org

www.askabide.org

FACEBOOK — Asociación Askabide

INSTAGRAM — @asociacionaskabide

SALUD

PAUTAS E INFORMACIÓN



PROBLEMAS

CON EL PRESERVATIVO

Los condones pueden **resbalar** del pene porque:

- No se desenrolló hasta la base del pene.
- El condón es demasiado grande para el pene.
- El pene no está lo bastante duro antes de poner el condón.
- El pene está flácido durante el sexo.
- El pene es más grueso en la base que en la cabeza.
- El cliente hace que el condón resbale.

Los condones se pueden **romper** porque:

- Usas un lubricante de base aceitosa como, por ejemplo, aceite de bebés, aceite de masaje o crema de manos.
- Tu vagina está seca y no hay suficiente lubricación.
- Los condones son demasiado viejos.
- El preservativo ha sido dañado por tus uñas o dientes al abrir el paquete.
- Usaste dos condones al mismo tiempo pensando que daría mayor protección; los condones pueden romperse cuando rozan uno con otro.

UTILIZA SOLO UN CONDÓN Y
PARA MAYOR PROTECCIÓN UN
CONDÓN EXTRAFUERTE



REVISA SIEMPRE LA
CADUCIDAD DEL PAQUETE



NO ABRAS EL PAQUETE CON LOS
DIENTES Y TEN CUIDADO CON
LAS UÑAS AL ABRIRLO

USA SIEMPRE LUBRICANTES
DE BASE ACUOSA



PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DEL
DESLIZAMIENTO DEL CONDÓN Y/O EVITAR
QUE EL CLIENTE PUEDA QUITÁRSELO,
MUCHAS TRABAJADORAS SEXUALES
SUJETAN LA BASE DEL CONDÓN A LA BASE
DEL PENE DURANTE DEL SEXO



SI PIENSAS QUE EL CONDÓN SE HA
RESBALADO O ROTO PARA
INMEDIATAMENTE EL ACTO SEXUAL

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

HEPATITIS B

La Hepatitis B está producida por un virus que puede afectar al hígado de manera crónica. En ocasiones puede producir cirrosis y cáncer de hígado. Se transmite por vía sexual, sanguínea o de madre a hijo. Muchas personas no tiene ningún síntoma en el momento de la infección. Existe una vacuna eficaz contra la hepatitis B que actualmente está incluida en el calendario vacunal.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

SÍFILIS

Al principio aparece una úlcera no dolorosa en la zona de contacto, que a veces puede pasar desapercibida dependiendo de la localización. Si no se trata desaparece espontáneamente pero la enfermedad continúa progresando, y puede provocar graves problemas de salud a largo plazo.

Se puede contraer a través de relaciones sexuales vaginales, anales y sexo oral. El tratamiento se realiza con antibióticos.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Los síntomas más frecuentes con: aumento del flujo vaginal, secreciones en el pene y/o escozor al orinar. Más del 50% de las mujeres y del 10% de los hombres no suelen tener síntomas.

G O

Se puede contraer a través de relaciones sexuales vaginales, anales y orales, por lo que puede afectar no

N O

solo a los genitales sino también al recto y a la garganta.

Se trata con antibióticos.

R R R E A

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

C H L A

M Y

D I A

Produce síntomas similares a la gonorrea, es decir, aumento del flujo vaginal, secreción del pene y/o escozor al orinar. Más del 70% de las mujeres y del 50% de los hombres no presentan síntomas. Se puede contraer a través de relaciones sexuales vaginales, anales y sexo oral. El tratamiento consiste en antibióticos.

VIRUS HERPES

La infección genital por herpes está causada por el virus herpes tipo 2.

Se manifiesta en pequeñas ampollas dolorosas y se transmite a través de relaciones sexuales vaginales, anales, sexo oral y con el contacto íntimo con la piel lesionada. Es frecuente que después de curar estas lesiones, se reactiven al cabo de un tiempo en forma de brotes.

Las lesiones se curan con un tratamiento específico, aunque el virus permanece en el organismo.

VIRUS PAPILOMA

Es una infección de transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano, La mayoría de las veces no suele presentar síntomas, pero en algunos casos puede causar verrugas o condilomas genitales y en muy pocos casos puede desembocar en un cáncer de cuello uterino o anal. En la actualidad este cáncer se previene a través de una vacuna que ya está introducida en el calendario vacunal.

Es la infección de transmisión sexual más frecuente y se transmite a través de relaciones sexuales vaginales, anales y sexo oral.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

V
I
H

En la actualidad el VIH se ha convertido principalmente en una infección de transmisión sexual. Se transmite por relaciones sexuales vaginales, anales, mientras que en el sexo oral el riesgo es menor. Normalmente no se manifiesta ningún síntoma durante los primeros años. No tiene cura, aunque gracias a los avances en el tratamiento se ha convertido en una enfermedad crónica.

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO UNA ITS?

Si has mantenido relaciones sexuales no protegidas, la única forma de saber si tienes una ITS es acudir a tu médico y hacerte las pruebas que están incluidas. Muchas de estas infecciones no tienen síntomas aparentes.

¿EL PRESERVATIVO PROTEGE DE LAS ITS?

El uso correcto del preservativo es la medida más eficaz para prevenir las ITS. Para que su eficacia sea máxima se ha de usar en todas las relaciones de principio a final. En el caso del herpes y del papiloma reduce las posibilidades de contagio, pero no las elimina por completo.

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO UNA ITS?

Si piensas que puedes tener una ITS debes contactar con tu médico de cabecera o, puedes acudir directamente a una de las consultas específicas de infecciones de transmisión sexual de osakidetza.



CONSULTAS ESPECÍFICAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

CONSULTA ITS SAN SEBASTIAN
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA
Pº DR. BEGIRISTAIN, 109
943.00.64.64 / 943.00.70.06

CONSULTA ITS BILBAO
CENTRO DE SALUD BOMBERO ETXANIZ
PLAZA BOMBERO ETXANIZ 1, 1º
946.00.69.69

CONSULTA ITS VITORIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA
TXAGORRITU
JOSÉ ATXOTEGI, S/N
945.00.75.00

CONSULTA ITS MENDARO
HOSPITAL MENDARO Bº MENDAROSABAL
S/N
943.03.28.45

MÁS INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN ASKABIDE
944.16.48.28

**PLAN DEL SIDA E INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL**
943.00.64.64

ASOCIACION T4
944.22.12.40

ITXAROBIDE
944.44.92.50

HARRI BELTZA
943.49.35.44

GEHITU
943.46.85.16

SIDÁLAVA
945.25.77.66

BIZKAISIDA
609.03.99.00